

FE DE ERRATAS

Esta **Tabla 8** reemplaza a la publicada en la *Rev. Hosp. Mat. Inf. Ramón Sardá 2006; 25 (4): 187*.

Defunciones neonatales

Tabla 8. Sobrevida neonatal según peso de nacimiento. HMIRS 2005.

Peso al nacimiento (g)	Nacidos vivos	Fallecidos menos de 28 días	FIP	Malformados e hidrops fallecidos	Fallecidos ≥ 29 días	% sobrevida neonatal excluyendo malformados e hidrops	% sobrevida post neonatal ≥29 días
501-749	15	14	3			6,7	6,7
750-999	25	9	0	2	1	69,6	65,2
1.000-1.249	27	6	1	3	1	87,5	83,3
1.250-1.499	26	1	0	1		100,0	100
1.500-1.749	57	7	1	6		98,0	98,0
1.750-1.999	68	6	1	4		96,9	96,9
2.000-2.249	146	7	2	6		99,3	99,3
2.250-2.499	231	5	1	4		99,6	99,6
2.500-2.999	1.243	5	1	5	1	100,0	99,9
≥3.000	5.263	7	2	1		99,9	99,9
Totales	7.101	67	12	32	3	99,5	99,0

TMN <1.500 g: 32,2%. FIP: Fallecidos inmediatamente al parto (Apgar 1'= 1; 5'= 0).

Prematuros (EG≤36 semanas): 633 (8,9%)

Prevalencia RN <1.500 g	1,3 %
Prevalencia RN <2.500 g	8,4 %
Mortalidad neonatal corregida (excl. <750 g, malformados e hidrops)	2,83 por mil
Mortalidad neonatal corregida (excl. malformados e hidrops)	4,93 por mil
Mortalidad neonatal corregida (excl. <750 g)	7,90 por mil
Mortalidad Neonatal global (≤ 28 días)	9,44 por mil
Mortalidad neonatal global + postneonatal global	9,86 por mil
Sobrevida neonatal para grupo <2.500 g y ≥ 750 g	92,9 %
Derivados n (%)	0
Contribución de los RN Malformados a la mortalidad neonatal	47,7 %
Contribución de los RN <750 g a la mortalidad neonatal	20,8 %
Índice TMN (global)/IMBP	0,75 %
Índice TMN (corregida >750 g excl. malformados)/IMBP	0,23
Sobrevida de los ingresos a UCIN (%)	94,5
Estimado de RN internados en cuidados especiales (n)	1.278